

AUS ERFAHRUNG FÜR DIE ZUKUNFT

Therapie gemeinsam gestalten

Mit Hexal an Ihrer Seite

L-Poladdict®
5 mg

L-Poladdict®
30 mg

L-Poladdict®
20 mg

NEU
L-Poladdict®

40 mg

SANDOZ



Die 40 mg Tablette macht es einfacher für alle

Für Sie



Für Ihr Praxisteam



Für Ihre Patienten



Mehr Sicherheit

Durch einfachere Kontrolle
der Einnahme



Geringere Zuzahlung für Patienten möglich

Durch eine Reduzierung der
Anzahl von Rezepten¹



Reduzierter Aufwand

Durch weniger Tabletten



1. Durch die Wirkstärke 40 mg kann bei hochdosierten Patienten die Tablettenanzahl und somit die Verschreibungsfrequenz reduziert werden, was in Abhängigkeit von der Packungsgröße zu geringeren Zuzahlungen führen kann.

Preise² und PZNs



18495947	28 Tabl.	71,71 €
18495976	56 Tabl.	131,91 €
18495982	98 Tabl.	223,03 €

Alle Wirkstärken
mit zugelassener
Teilbarkeit³

2. AVP gemäß Lauer Taxe Stand 01.10.2025, alle Preise in Euro; Rabatte in eventuell bestehenden Rabattverträgen sind unberücksichtigt.

3. Fachinformation L-Poladdict® Tabletten, Stand September 2023; Fachinformation L-Poladdict® 40 mg Tabletten, Stand September 2023

L-Poladdict® 40 mg Tabletten,

Wirkstoff: Levomethadon-HCl. Zusammensetzung: Jede Tbl. enth. Levomethadon als 40 mg Levomethadon-HCl. Sonstige Bestandteile: mikrokrist. Cellulose, Stärkehydrolysat (7,8-9,2 %), Mannitol (Ph.Eur.), Carboxymethylstärke-Na (Typ A) (Ph.Eur.), hochdisp. Siliciumdioxid, Mg-stearat (Ph.Eur.) [pflanzl.]. Anwendungsgeb.: Zur oralen Substitutionsbehandl. b. Opioidabhängigk. im Rahmen medizin., sozialer u. psycholog. Maßn. b. Erw. Gegenanz.: Überempfind. geg. Inhaltsst.; Behndl. m. MAO-Hemmern od. innerh. v. 2 Wo. nach deren Absetzen; gleichz. Anwend. v. Opioidantagonisten od. and. Opioidagonisten/-antagonisten (z. B. Pentazocin, Buprenorphin), außer z. Behndl. e. Überdos. Nebenwirk.: Häufig zu Beginn d. Substitutionsbehandl. Opiat-Entzugssympt. (z. B. Angstzustände, Anorexie, unwillkür. zuck. u. stoß. Beweg., Darmkrämpfe, Depress., Diarrhö, Erbrechen, Fieber, wechselw. Frösteln u. Hitzewall., Gähnen, Gänsehaut, Gewichtsverl., Tachyk., lauf. Nase, Niesen, Mydriasis, Reizbark., Schläfrigg., allg. körperl. Schmerzen, plötzl. Asthenie, starkes Schwitzen, verstärk. Tränenfluss, Nausea, Unruhe, Unterleibskrämpfe, Tremor); Anorexie, Hypoglykämie; Euphorie u. Dysphorie, Abhängigk.; Benommenh., Sedierung, Verwirrth., Desorientierrh., Kopfschm., Insomnie, Unruhe; Sehstör.; Palpitat., Bradyk., kard. Arrhyth. (Synkopen), Herzstillst.; Sickerblut. (Hämorrhagie), orthostat. Hypotonie, Einschränkung. d. Kreislauffunkt., Schock; Atemdepress., Atemstillst., zentr. Schlafapnoe-Syndr.; Erbrechen, Nausea, Mundtrockenh., Verstopf.; Gallenwegskrämpfe; Urtikaria u. and. Arten d. Hautausschlags, Juckr.; vermind. Harnmenge, Blasenentleer-stör.; eingeschr. Libido u./od. eingeschr. Potenz; vermehrtes Schwitzen, Mattigk., plötzl. Asthenie, Ödeme, Flush. Warnhinw.: Dop.! Die Tbl. sind erst unmittelbar v. d. Anwend. aus d. Pack. zu entnehmen. Die Tbl. dürfen nicht vorzeitig f. e. spät. Einnahme aus d. Pack. entnommen werden. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Verschreibungspflichtig (BtM). Mat.-Nr.: 51015884 Stand: September 2023, Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de

L-Poladdict® 5 mg/- 20 mg/- 30 mg Tabletten,

Wirkstoff: Levomethadon-HCl. Zusammensetzung: Jede Tbl. enth. Levomethadon als 5 mg/20 mg/30 mg Levomethadon-HCl. Sonstige Bestandteile: mikrokrist. Cellulose, Stärkehydrolysat (7,8-9,2 %), Mannitol (Ph.Eur.), Carboxymethylstärke-Na (Typ A) (Ph.Eur.), hochdisp. Siliciumdioxid, Mg-stearat (Ph.Eur.) [pflanzl.]. Anwendungsgeb.: Zur oralen Substitutionsbehandl. b. Opioidabhängigk. im Rahmen medizin., sozialer u. psycholog. Maßn. b. Erw. Gegenanz.: überempfind. geg. Inhaltsst.; Behndl. m. MAO-Hemmern od. innerh. v. 2 Wo. nach deren Absetzen; gleichz. Behndl. m. Opioidantagonisten od. and. Opioidagonisten/-antagonisten (z. B. Pentazocin, Buprenorphin) (außer z. Behndl. e. überdos.). Nebenwirk.: Häufig zu Beginn d. Substitutionsbehandl. Opiat-Entzugssympt. (z. B. Angstzustände, Anorexie, unwillkür. zuck. u. stoß. Beweg., Darmkrämpfe, Depress., Diarrhö, Erbrechen, Fieber, wechselw. Frösteln u. Hitzewall., Gähnen, Gänsehaut, Gewichtsverl., Tachyk., lauf. Nase, Niesen, Mydriasis, Reizbark., Schläfrigg., allg. körperl. Schmerzen, plötzl. Asthenie, starkes Schwitzen, verstärk. Tränenfluss, Nausea, Unruhe, Unterleibskrämpfe, Tremor); Anorexie, Hypoglykämie; Euphorie u. Dysphorie, Abhängigk.; Benommenh., Sedierung, Verwirrth., Desorientierrh., Kopfschm., Insomnie, Unruhe; Sehstör.; Palpitat., Bradyk., kard. Arrhyth. (Synkopen), Herzstillst.; Sickerblut. (Hämorrhagie), orthostat. Hypotonie, Einschränkung. d. Kreislauffunkt., Schock; Atemdepress., Atemstillst., zentr. Schlafapnoe-Syndr.; Erbrechen, Nausea, Mundtrockenh., Verstopf.; Gallenwegskrämpfe; Urtikaria u. and. Arten d. Hautausschlags, Juckr.; vermind. Harnmenge, Blasenentleer-stör.; eingeschr. Libido u./od. eingeschr. Potenz; vermehrtes Schwitzen, Mattigk., plötzl. Asthenie, Ödeme, Flush. Warnhinw.: Dop.! Die Tbl. sind erst unmittelbar v. d. Anwend. aus d. Pack. zu entnehmen. Die Tbl. dürfen nicht vorzeitig f. e. spät. Einnahme aus d. Pack. entnommen werden. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Verschreibungspflichtig (BtM). Mat.-Nr.: 51016171 Stand: September 2023 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de

www.hexal.de

SANDOZ

